

佐世保市総合医療センター大腸がんレジメン(2020年4月現在)

レジメン名称	内容	1サイクル日数
RPMI	レボホリナート: 250mg/m ² (Day1,8,15,22,29,36) + 急速5FU: 600mg/m ² (Day1,8,15,22,29,36)	56日
sレボホリナート5Fu2	レボホリナート: 200mg/m ² (Day1) + 急速5FU + 持続5FU(Day1)	14日
mFOLFOX6	レボホリナート: 200mg/m ² + オキサリプラチン: 85mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400mg/m ² (Day1)	14日
FOLFIRI	レボホリナート: 200mg/m ² + イリノテカン: 150mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400/m ² (Day1)	14日
mFOLFOXIRI + アバスチン	ベバシズマブ: 5mg/kg + イリノテカン: 150mg/m ² + レボホリナート: 200mg/m ² + オキサリプラチン: 85mg/m ² + 持続5FU: 2400~3000mg/m ² (Day1)	14日
mFOLFOXIRI + アービタックス	セツキシマブ: 250(初回400)mg/m ² (Day1,8) イリノテカン: 150mg/m ² + レボホリナート: 200mg/m ² + オキサリプラチン: 85mg/m ² + 持続5FU: 2400~3000mg/m ² (Day1)	14日
イリノテカン-A法	イリノテカン: 100mg/m ² (Day1,8,15)	28日
イリノテカン-B法	イリノテカン: 150mg/m ² (Day1,15)	35日
アバスチン+mFOLFOX6	ベバシズマブ: 5または10mg/kg + レボホリナート: 200mg/m ² + オキサリプラチン: 85mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400mg/m ² (Day1)	14日
アバスチン+FOLFIRI	ベバシズマブ: 5または10mg/kg + レボホリナート: 200mg/m ² + イリノテカン: 150mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400mg/m ² (Day1)	14日
アバスチン+sレボホリナート5Fu2	ベバシズマブ: 5または10mg/kg + レボホリナート: 200mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400mg/m ² (Day1)	14日
アバスチン+RPMI	ベバシズマブ: 10mg/m ² (Day1,15,29,43) + レボホリナート: 250mg/m ² (Day1,8,15,22,29,36) + 急速5FU: 600mg/m ² (Day1,8,15,22,29,36)	56日
IRIS(TS1+イリノテカン)	TS1: 80~120mg/day(Day1~14) + イリノテカン: 150mg/m ² (Day1,15)	28日
XELOX(CapOX)	カペシタビン: 2000mg/m ² (Day1~14) + オキサリプラチン: 130mg/m ² (Day1)	21日
XELOX(CapOX) + アバスチン	カペシタビン: 2000mg/m ² (Day1~14) + オキサリプラチン: 130mg/m ² (Day1) + ベバシズマブ: 7.5mg/kg(Day1)	21日
XELOX(CapOX) + アービタックス	カペシタビン: 2000mg/m ² (Day1~14) + オキサリプラチン: 130mg/m ² (Day1) + セツキシマブ: 250(初回400)mg/m ² (Day1,8,15)	21日
SOX	TS-1: 80~120mg/day(Day1~14) + オキサリプラチン: 130mg/m ² (Day1)	21日
SOX + アバスチン	TS-1: 80~120mg/day(Day1~14) + オキサリプラチン: 130mg/m ² (Day1) + ベバシズマブ: 7.5mg/m ² (Day1)	21日
アービタックス+mFOLFOX	セツキシマブ: 250(初回400)mg/m ² (Day1,8) レボホリナート: 200mg/m ² + オキサリプラチン: 85mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400~3000mg/m ² (Day1)	14日
アービタックス+FOLFIRI	セツキシマブ: 250(初回400)mg/m ² (Day1,8) レボホリナート: 200mg/m ² + イリノテカン: 150mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400~3000mg/m ² (Day1)	14日
ベクティビックス+mFOLFOX	パニツムマブ: 6mg/kg + レボホリナート: 200mg/m ² + オキサリプラチン: 85mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400~3000mg/m ² (Day1)	14日
ベクティビックス+FOLFIRI	パニツムマブ: 6mg/kg + レボホリナート: 200mg/m ² + イリノテカン: 150mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400~3000mg/m ² (Day1)	14日
ベクティビックス単独	パニツムマブ: 6mg/kg(Day1)	14日
ベクティビックス+イリノテカン	パニツムマブ: 6mg/kg(Day1) + イリノテカン: 150mg/m ² (Day1)	14日
アバスチン+XELIRI	カペシタビン: 2000mg/m ² (Day1~14) + ベバシズマブ: 7.5mg/kg(Day1) + イリノテカン: 200mg/m ² (Day1)	21日
IRIS II(3週1クール)	TS-1: 80~120mg/day(Day1~14) + イリノテカン: 150mg/m ² (Day1)	21日
XELIRI	カペシタビン: 2000mg/m ² (Day1~14) + イリノテカン: 200mg/m ² (Day1)	21日
IRIS II(3週1クール)+アバスチン	TS-1: 80mg/day(Day1~14) + ベバシズマブ: 7.5mg/kg(Day1) + イリノテカン: 150mg/m ² (Day1)	21日
IRIS(4週1クール)+アバスチン	TS-1: 80~120mg/day(Day1~14) ベバシズマブ: 5または10mg/kg + イリノテカン: 125mg/m ² (Day1,15)	28日
IRIS(4週1クール)+ベクティビックス	TS-1: 80~120mg/day(Day1~14) パニツムマブ: 6mg/kg + イリノテカン: 125mg/m ² (Day1,15)	28日
IRIS(北里レジメン)	TS-1: 80~120mg/day(Day1~5,8~12) + イリノテカン: 80~120mg(Day1,8) + Radiation	21日
5FU+MMC+RT(肛門管がん)	5FU: 1000mg/m ² (Day1~4) + マイトマイシンC: 10mg/m ² (Day1) (Radiation: Day1~5,8~12,15~19,22~26) ※2コースまで	28日
サイラムザ+FOLFIRI	ラムシルマブ: 8mg/kg + レボホリナート: 200mg/m ² + イリノテカン: 150mg/m ² + 急速5FU: 400mg/m ² + 持続5FU: 2400mg/m ² (Day1)	14日
アバスチン+内服抗がん剤	ベバシズマブ5mg/kg(Day1/2週間) ベバシズマブ15mg/kg(Day1/3週間)	
アービタックス単独	セツキシマブ: 250mg/m ² (Day1)※初回のみ400mg/m ²	7日
アービタックス+イリノテカン(隔週)	セツキシマブ: 250mg/m ² (Day1,8)※初回のみ400mg/m ² + イリノテカン: 150mg/m ² (Day1)	14日

ザルトラップ+FOLFIIRI	アフリベルセプト:4mg/kg+レボホリナート:200mg/m ² +イリノテカン:150mg/m ² +急速5FU:400mg/m ² +持続5FU:2400/m ² (Day1)	14日
ザルトラップ+内服抗がん剤	アフリベルセプト:4mg/kg (Day1)	14日